

精巣癌、根治的精巣除去術を受けられる(

さん) 手術日時: 月 日

経過日数 分類	手術前日 開始日	手術当日・前	手術当日・中 2日目	手術当日・後	手術後1日目 3日目	手術後2日目 4日目	手術後3日目 5日目	
患者説明資料	処方 	寝る前に下剤を飲みます						
	注射 		朝から点滴をします。	点滴が続きます。	点滴が続きます。	点滴終了後点滴の管を抜きます。		
	処置 	静脈ルートを確保します。 弾性靴下のサイズを測ります。 手術部位の体毛処理をします。	血圧、体温などを測ります。	血圧、体温を随時測ります。 採血をします。 弾性靴下をぬぎます。 酸素の管をつけています。 	血圧、体温を随時測ります。 採血をします。			
	検体検査 			採血があります	採血があります		採血があります	
	食事 	21時まで、固形物などは摂取できません(水とお茶は許可されます)。	食べたり、飲んだり、出来ません	食べたり、飲んだり、出来ません 麻酔の覚める状況によって水分が飲むことができます。	朝から食事が食べられます。			制限ありません
	清潔 	入浴できます	タオルでの清拭となります。	入浴、シャワー浴が出来ないため、体を拭きます	タオルでの清拭となります。	おしっこの管をつけたまま入ることになります。 入浴・シャワー浴する前に看護師に言って下さい。	シャワー浴ができます。	
	体動 	制限はありません	手術室まではベッドで行くことになります。	ベッド上安静です。 麻酔覚めてからベッドの上で体を動かすのは可能です。	歩行できます。 (動く時は看護師に伝えてください)	制限はありません 体動は自由です 積極的に歩きましょう。	制限はありません	
	排泄 	排便状況を確認します。 機械におしっこをためてもらいます。		おしっこの管が入っています。 排便はベッド上ですることになります。	おしっこの管が入っています。 排便はトイレでできます。	おしっこの管が入っています。 排便はトイレです。	おしっこの管が入っています	
	教育・指導 	医師から手術について、麻酔科医師から麻酔について説明があります 手術室の看護師から説明があります T字帯、バスタオルを用意してください。	入れ歯、コンタクト、指輪ヘアピン、時計を外していきます T字帯・弾性靴下を着け、長病衣へ着替えます。	医師から、手術の経過の説明があります 下記の症状が出たら教えてください。 ・赤いおしっこが出る ・おしっこがしたい感じがある ・便がしたくなる ・お腹が張る ・息苦しい感じがする				

主治医:( ) 説明看護師:( )