経尿道的尿管結石破砕術を受けられる(

)さん 手術日時: 月 日()

日付	/		/	/	/	/
1413	手術前日	手術当日•前	手術当日•後	手術後1日目	手術後2日目	手術後3日目
	入院日			388	4日目	5日目/退院日
処方						
,_,,						
		【 - 【手術室で】点滴をします。	点滴があります。	点滴が続きます。	 点滴終了後点滴の管を抜きます。	
للغالد						
注射						
	7844447 0 U (7 1	7 1	7 1	7 1	
	弾性靴下のサイズを測ります。	血圧、体温などを測ります。	血圧、体温を随時測ります。	血圧、体温を随時測ります。 採血をします。	血圧、体温を随時測ります。	
		弾性靴下をはきます	指示があるまで弾性靴下は脱げません。	弾性靴下をぬぎます。		
処置		点滴を始めます。	酸素の管をつけています。 心電図モニターをつけます。			
					()	
					W A	
				## IT / 18 h 11 h 1	-0	
			手術終了後に採血があります	朝、採血があります		
検体検査			QU.	at a second		
	21時以降は固形物は摂取できません。 水とお茶の摂取時間は麻酔科医師の指	食べたり、飲んだり、出来ません	食べたり、飲んだり、出来ません	朝から食事が食べられます。	制限ありません	制限ありません
4	示により決まります。		麻酔の覚める状況によって水分が飲む ことができます。			
食事		\A	8	(単年)		8
	21:00			9		
	$\overline{}$	<i>7</i> = \	入浴、シャワー浴が出来ないため、体を		入浴・シャワー浴する前に看護師に言っ	
	入浴できます	タオルでの清拭となります。	拭きます	タオルでの清拭になります。	て下さい。	
清潔		•		具合が良ければシャワー浴も可能です		
111 17K	£ 22	17	13	12	{ Q }	
		123	43	63		
	制限はありません	制限はありません。	ベット上安静です。	回診で問題なければ歩行できます。	体動は自由です	体動は自由です
			麻酔覚めてからベットの上で体を動か すのは可能です。	<u>★ 歩行する前に必ず看護師にお知ら</u> せ下さい ★	積極的に歩きましょう。	積極的に歩きましょう。
体動	50	mos	MCS		50	9
	是			会	分	4
		0	Po##1 Tutt		# Boethard whence	20
	排便状況を確認します。 尿をためてもらいます。		尿の管が入っています。 排便はベッド上ですることになります。	尿の管が入っています。 排便はトイレでできます。	朝、尿の管を抜きます。 少し痛いです。 管を抜いた後機械に尿を貯めてください。	
					排便はトイレです。	
排泄					おしっこの回数、量を記載していきます。 石が出た場合は捨てずに看護師に伝え	
7717/15	~		2		てください。	
			1	1	WC 00	
	CO .				₹X	
	医師から手術について、麻酔科医師から		医師から、手術の経過の説明がありま		水分を多めにとって下さい	退院後の水分摂取目標量を伝えます
	麻酔について説明があります 手術室の看護師から説明があります	計を外していきます 長病衣へ着替えます。	す 下記の症状が出たら教えてください。		尿の回数が多い場合は教えてください	たっぱく マンスング はく はい
	バスタオルを用意してください。	スパンペータ目にあり。	赤い尿が出る		シャンログル・シャー参口は大人 こくについ	次回受診の説明をします
			・尿がしたい感じがある・便がしたくなる			
			・お腹が張る			
		•	・息苦しい感じがする			
		[[]	_(3) B			
		4	448			
	CARAL CO.		1000-000		·	·

主治医:

説明看護師: